

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УССР

ЧЕРНОВИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ XXI НАУЧНОЙ СЕССИИ

СЕКЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

(май — июнь)

Черновцы, 1965 г.

М. С. КОЖУРИНА

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ

Изучением рельефа Черновицкой области занимались К. И. Геренчук, Б. И. Иванов, М. С. Кожурина, Н. А. Куница; вопросы овражно-эрозионного расчленения области освещались в работах Н. А. Куницы, М. С. Кожуриной, П. М. Биксея, Р. Д. Бойко; геоморфологический анализ тектоники проводили К. И. Геренчук, М. С. Кожурина; описание строения отдельных геоморфологических объектов находим в работах К. И. Геренчука, С. И. Проходского, В. Г. Лебедева, Н. А. Куницы, Я. Р. Дорфманг, В. И. Чопа и др. М. С. Кожуриной была составлена геоморфологическая карта Черновицкой области (1957 г.) и проведено районирование для целей сельскохозяйственного производства.

Однако возросшие запросы современного народного хозяйства, в частности осуществление мелиоративных, противоэрозионных, строительных работ, планировка населенных пунктов, специализация сельского и лесного хозяйства и т. д., выдвигают новые требования в отношении детальной геоморфологической характеристики как области в целом, так и отдельных ее частей. Для разработки последней нами широко привлекались, кроме вышеуказанных источников, также и материалы геологических организаций, в частности Львовской геолого-поисковой конторы, Черновицкого филиала Гипрогражданпромстроя.

Обработка названных материалов позволила провести довольно детальное геоморфологическое районирование Черновицкой области. При этом основные морфоструктурные единицы рассматриваемой территории — платформа и геосинклиналь, обусловившие формирование двух главных групп типов рельефа — равнинного и горного, — положены в основу выделения двух провинций:

1) волнисто-грядовой равнины, образованной на шельфах Русской платформы и Предкарпатского прогиба;

2) молодых складчатых хребтов Буковинских Карпат. Тектонико-литологические особенности, происхождение рельефа положены в основу определения областей, современные рельефообразующие процессы — районов, а показатели морфологического расчленения — подрайонов.

В первой провинции выделены две области: **Покутско-Бессарабская волнистая равнина и холмисто-грядовое предгорье Буковинских Карпат.**

Первая область, занимающая Прут-Днестровское междуречье состоит из следующих районов и подрайонов.

1. Район карстово-террасового Покутья.

Подрайоны:

- 1) каньоновидной долины Днестра,
- 2) закарстованного понижения Городенковской долины,
- 3) холмистой с галечниковыми покровами Кицманской гряды,
- 4) высоких террас долины Прута,
- 5) низких равнинных террас долины Прута.

2. Район эрозионно-тектонической Хотинской возвышенности.

Подрайоны:

- 1) эрозионного холмогорья северо-западного выступа Хотинской возвышенности,
- 2) эрозионно-тектонического рельефа гряд Бердо-Городище, Червоный Горб,
- 3) котловинно-террасового рельефа Черновской впадины,

4) куполовидного поднятия Мошковской возвышенности,

5) террасово-грядового рельефа Задубровско-Гуково-Мошковских перемычек,

6) плосковершинных гряд с интенсивным овражно-балочным расчленением склонов Грозинецко-Блищадского блока,

7) асимметричных гряд с оползневыми южными склонами Клишковско-Недобоевского блока.

3. Район Новоселицкой террасовой равнины.

Подрайоны:

- 1) Ставчано-Кругликский эрозионно-холмистого рельефа,
- 2) Синковецкий плосковершинно-грядовый,
- 3) равнинно-террасовый долины Прута,
- 4) поймы Прута.

4. Район Хотинско-Мамалыжского эрозионно-тектонического холмогорья.

Подрайоны:

- 1) холмисто-балочного рельефа левобережья реки Стальновки,
- 2) холмисто-грядового долинно-балочного рельефа бассейна реки Балковки.

5. Район Кельменецко-Бессарабской пластовой равнины.

Подрайоны:

- 1) каньоновидной с интенсивным овражным расчленением долины Днестра,
- 2) глубоких долин притоков Днестра,
- 3) холмисто-останцевой толтовой гряды,
- 4) междуречных плато Кельменецко-Бессарабской равнины.

Во второй области, занимающей территорию между р. Прут и Карпатами, выделяем:

1. Район крутого оползнево-овражного склона долины Прута.

Подрайоны:

- 1) низко-террасового рельефа,
- 2) оползнево-террасового рельефа,
- 3) грядово-террасового рельефа.

2. Район Цецинской эрозионно-тектонической возвышенности.

Подрайоны:

- 1) эрозионно-грядового рельефа возвышенности Цецино,
- 2) эрозионно-куполовидного рельефа Сопи-горы,
- 3) холмисто-грядового рельефа массива Поенита.

3. Район Причеремошского террасово-холмистого рельефа.

Подрайоны:

- 1) низких равнинных террас долины Черемоша,
- 2) высоких террас долины Черемоша,
- 3) долины р. Брусницы,
- 4) холмисто-грядового эрозионно-оползневого рельефа междуречий.

4. Район Дерелуйско-Герцаевский холмисто-грядового оползневого рельефа.

Подрайоны:

- 1) холмисто-котловинного рельефа бассейна р. Дерелуй,
- 2) Герцаевско-Турятский холмистый оплывинно-оползневой.

5. Район Серетско-Буковинского подгорья.

Подрайоны:

- 1) террасовой равнины Багна-Серетской долины,
- 2) холмисто-грядового оползнево-оплывинного рельефа междуречья Серет — Малый Серет,
- 3) террасового рельефа долины Малый Серет — Серетель,
- 4) холмисто-грядового балочно-овражного рельефа Красноильского подгорья.

Провинция Буковинских Карпат состоит из пяти районов: 1. Район низкогорных хребтов краевых Карпат с подрайонами: низкогорья конусовидных гор Черемош-Серетского междуречья, симметричных хребтов Мало-Серетского бассейна; 2. Район асимметричных среднегорных хребтов Скибовой зоны с подрайонами: причеремошских хребтов — Товарицы, Травена, Чиохельки; присеретских хребтов — Букова, Томнатика, Чи-

мирной; хребтов значительного поперечного расчленения — Ракова, Шурдин; 3. Район внутриворонного низкогорья Путильской зоны с подрайонами долины Путилы и око-допутильского низкогорья; 4. Район массивных плоско-вершинных хребтов внутренней зоны; 5. Район среднегорных скалистых хребтов центральной (Мармарошской) зоны.

Н. Н. РЫБИН

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ПРУТ-СЕРЕТСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ

Прут-Серетское междуречье Черновицкой области представляет сильно расчлененную предгорную возвышенность средней высотой 300—400 м (максим. выс. 538 м). Расположено оно в пределах передового Прикарпатского прогиба и сложено третичными известняками, глинами, песчаниками и др. Прут-Серетское междуречье имеет сравнительно влажный климат и характеризуется большой облесенностью. Преобладают чистые буковые и смешанные пихтово-буковые леса, имеющие определенное хозяйственное значение. Почвенный покров составляют преимущественно серые лесные почвы различной степени оглеенности и оподзоленности. Ввиду сильной расчлененности поверхности и значительной крутизны склонов возможности земледелия в общем ограничены. На непригодных для распашки землях широкое распространение получили пастбища и сенокосы.

Прут-Серетское междуречье при физико-географическом районировании Черновицкой области обычно выделяют в один природный район (К. И. Геренчук, 1949; Н. Н. Рыбин, 1957). Однако природные условия его далеко не однородны и возможности хозяйственного использования также не везде одинаковы. Резче всего проявляются различия между западной (Вашковской), хорошо увлажненной, типично предгорной частью междуречья с буковыми и смешанными лесами, мезофильными лугами и дерново-подзолистыми почвами, центральной (Черновицкой), наиболее возвышенной частью с относительно прохладным климатом, крупными