

НАУКОВИЙ
ВІСНИК
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рік заснування 1996

Випуск 655

Географія

Збірник наукових праць

Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 655 : Географія. – 144 с.

Scientific Herald of Chernivtsy University : collection of scientific papers. Chernivtsy : Chernivtsy National University, 2013. – Is. 655 : Geography. – 144 p.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми фізичної географії та соціально-економічної географії, над якими працюють науковці Чернівецького національного університету та інших наукових установ і вузів України.

The articles in the journal highlight actual problems of physical geography, economic and social geography, which are studied by the scientists of Chernivtsy National University and other universities and research institutes of Ukraine.

***Друкується за ухвалою вченої ради
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича***

Редакційна колегія:

Головний редактор **В.П. Руденко**
Заступник головного редактора **В.П. Круль**

Editorial Board:

Editor-in-Chief: **V.P. Rudenko**
Deputy Editors: **V.P. Krul**

**В.М. Гуцуляк, В.О. Джаман, М.В. Жук,
М.І. Кирилюк, К.Й. Кілінська,
Ю.С. Ющенко**

**V.M. Gutsuleak, V.O. Djaman, M.V. Juk,
M.I. Kyryliuk, K.Y. Kilinska,
Yu.S. Yushchenko**

Редакційна рада:

В. Андрейчук (Польща) **V. Andreychuk** (Poland)
О. Володченко (Німеччина) **A. Wolodtschenko** (Germany)
М. Куниця (Росія) **M. Kunitsa** (Russia)
К. Місевич (Росія) **K. Misevich** (Russia)
П. Спішак (Словаччина) **P. Spisiak** (Slovakia)
І. Стебельський (Канада) **I. Stebelsky** (Canada)
В. Сурд (Румунія) **V. Surd** (Romania)

Editorial Council:

Відповідальний секретар **С.М. Кирилюк**

Responsible Secretaries: **S.M. Kyryliuk**

Свідectво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Міністерства Юстиції України серія KB № 15750-4222P від 26.10.2009

***Загальнодержавне видання
Входить до переліку наукових видань ДАК України***

Адреса редколегії:
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
географічний факультет,
вул. Коцюбинського, 2
м. Чернівці, Україна, 58012

Adress for correspondence
Chernivtsy National University
named after Yuriy Fed'kovych,
Faculty of Geography,
Kotsyubynskyi Str., 2
Chernivtsy, Ukraine, 58012

E-mail: galinahodan@gmail.com

©Чернівецький національний університет, 2013

ЗМІСТ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Батечко М.О.МОХОПОДІБНІ ЯК ІНДИКАТОРИ СТУПЕНЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДИГРЕСІЇ ФІТОЦЕНОЗІВ
(НА ПРИКЛАДІ ПАРКІВ МІСТА ЧЕРНІВЦІ) 7**Березка І.С.**

ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ МОРФОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ 12

Буц Ю.В.

НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПРОГЕННОГО ЧИННИКА

НА ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ БОРОВОЇ ТЕРАСИ РІЧКИ УДИ 16

Вах І.

ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ ТЕРИТОРІЇ

ЯК ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСУ

НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ ГАЛИЦЬКОЇ ҐУЦУЛЬЩИНИ 20

Григорійчук В.В.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОДОЗАБОРІВ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 23

Добинда І.П.

ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 27

Кирилюк Л., Корінний В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИСОТНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ "МОЛОДОГО"

АКУМУЛЯТИВНОГО ВИСОТНО-ЛАНДШАФТНОГО РІВНЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЛЯ 31

Кирилюк О., Кирилюк С.

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ОДНОРІДНІ ДІЛЯНКИ

РІЧОК БАСЕЙНОВИХ СИСТЕМ ГУКОВА, ДЕРЕЛУЮ ТА ВИЖЕНКИ 35

Мартинюк В.

ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ

ОЗЕРА БІЛЬСЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ)

ЯК РЕПЕРНОГО ОБ'ЄКТА ЛІМНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 39

Николаєв А.М.

ГІДРОХІМІЧНИЙ РЕЖИМ РІЧКИ ДЕРЕЛУЙ 46

Новодран О.В., Нікіпелова О.М., Солодова Л.Б., Коєва О.М., Коєва Х.О., Захарченко Є.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ

НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ВИЖНИЦЬКИЙ"

(ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ) ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 52

Присакар В.Б.

ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСЕЛЕНСЬКИХ ГЕОСИСТЕМ

ТЕРИТОРІЇ ПРУТ-СІРЕТСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ (В МЕЖАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 55

Приходько М.М.

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ГЕОСИСТЕМ - НАУКОВИЙ НАПРЯМ КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ 58

Сергєєва Т.М.

ВІКТОР КОНРАД - НОВЕ ІМ'Я В ІСТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 65

Соловей Т.В.

ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНА СИСТЕМАТИКА БОЛІТ ПОСТҐЛЯЦІАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ 70

Танасюк М.В.

ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ГЕОСИСТЕМ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ

(НА ПРИКЛАДІ КЛЮЧОВОЇ ДІЛЯНКИ МИГОВЕ) 74

Тиханович Є.Є.

ЛАВИННІ ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

ДАВНЬОЛЬДОВИКОВОГО РЕЛЬЄФУ ЧОРНОГОРИ 78

Ходан Г., Камінська Л.

ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ ДОЛИНИ ДНІСТРА НА ВІДРІЗКУ М. ХОТИН - ДО С. ОЖЕВО 83

Холопцев О.В., Зуділова Л.А.

ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВОЇ МІНЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕНЬ МІЖ КОНЦЕНТРАЦІЯМИ Rb ТА K

У ФРАКЦІЯХ АЕРОЗОЛЮ НА УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО МОРЯ (НА ПРИКЛАДІ М. СЕВСТОПОЛЬ) 86

Шевчук Ю.Ф.	
СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ	90
Щегульна Я.О., Савицький В.М.	
ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ЯКОСТІ ВОДИ РІЧОК БАСЕЙНУ ПІВДЕННОГО БУГУ	93

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Бурка В.	
ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ДЕМОНТАЖУ	
СТАРИХ ОБ'ЄКТІВ ПРОДУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ	98
Геренчук М.В., Заячук М.Д.	
ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ	
В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ	103
Заблотовська А.Г.	
ОСНОВНІ ФОРМИ ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ	107
Заячук О., Дроняк Г.	
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МЕРЕЖІ	
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	111
Львів О.М.	
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ	
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ	116
Кузишин А.	
АНАЛІЗ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	
В СВІТЛІ ПОКАЗНИКІВ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ	120
Лопушняк Л.В.	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИДІВ І КЛАСИФІКАЦІЇ БЕЗРОБІТТЯ	125
Симочко Г.В.	
НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ	
ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ТУРИСТИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ	129
Яворська В.В.	
ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА ПОНЯТТЯ ГЕОДЕМОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ	134

CONTENS

PHYSICAL GEOGRAPHY

Batechko M.O.MOSSY AS AN INDICATOR OF THE DEGREE OF RECREATIONAL
DEGRESSION PHYTOCENOSSES (FOR EXAMPLE, PARKS CHERNIVTSI) 7**Berezka I.S.**

APPROACHES AND PRINCIPLES MORPHOMETRIC ANALYSIS 12

Buts Y.V.THE CONSEQUENCES OF INFLUENCE OF FIRE FACTOR ARE ON SOILS PROPERTY
OF THE CONIFEROUS FOREST TERRACE OF THE RIVER UDY 16**Vakh I.**NATURAL CONDITIONS AND RESOURCES
OF THE TERRITORY AS A FACTOR COMPLEX DEVELOPMENT
OF NATIONAL ART CRAFTS GALICIAN HUTSULSHCHYNA 20**Hryhoriychuk V.**THE REGIONAL FEATURES OF USING INFILTRATION WATER
INTAKES IN THE IVANO-FRANKIVSK REGION 23**Dobynda I.**MONUMENTS OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING VOLYN REGION
AND THEIR TERRITORIAL CHARACTERISTICS 27**Kirilyuk L., Korinnyi V.**FEATURES HIGH-ALTITUDE DIFFERENTIATION OF ANTHROPOGENIC LANDSCAPES
OF THE "YOUNG" ACCUMULATIVE LANDSCAPE-LEVEL ALTITUDE IN PODOLIA 31**Kiriliuk O., Kiriliuk S.**ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON THE RIVER'S HOMOGENOUS PLOT
OF GUKIV, DERELUY AND VIZHENKA BASIN SYSTEMS 35**Martyniuk V.**THE GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE BASIN SYSTEM OF LAKE BILSKE (VOLYN POLESSYA)
AS THE OBJECT OF REFERENCE OF LIMNOLOGICAL MONITORING 39**Nikolaev A.N.**

HYDROCHEMICAL REGIME OF THE DERELUY RIVER 46

Novodran O.V., Nikipelova O.M., Solodova L.B., Koeva O.M., Koeva C.O., Zaharchenko E.A.GROUND OF POSSIBILITY OF CREATION
ON TERRITORY OF NATIONAL NATURAL PARK "VIJNICKIY"
(CHERNIVTSI AREA) MEDICAL ESTABLISHMENTS 52**Prysakar V.B.**LANDSCAPE-GEOCHEMICAL ANALYSIS
OF SETTLEMENT TERRITORY GEOSYSTEMS PRUT-SIRETSKOHO WATERSHED
(WITHIN THE CHERNIVTSI REGION) 55**Prykhodko M.M.**THE ENVIRONMENTAL SAFETY OF GEOSYSTEMS IS A SCIENTIFIC DIRECTION
OF CONSTRUCTIVE GEOGRAPHY 58**Sergeeva T.**

VICTOR CONRAD - A NEW NAME IN HISTORY OF CHERNIVTSI UNIVERSITY 65

Solovey T.V.

HYDROLOGICAL AND HYDROCHEMICAL TAXONOMY WETLANDS OF POSTGLACIAL AREAS 70

Tanasyuk M.V.LANDSCAPE-GEOCHEMICAL FEATURES OF THE ECOLOGICAL CONDITION
OF RURAL GEOSYSTEMS NORTHERN BUKOVINA (FOR EXAMPLE KEY ELEMENT MYHOVE) 74**Tykhonovych Ie.**

AVALANCHE NATURAL TERRAIN COMPLEX IN CHORNOGORA OLD-GLACIAL RELIEF 78

Hodan G.D., Kaminska L.

LANDSCAPES DNIESTER VALLEY IN THE INTERVAL C.HOTIN - TO C.OZHEVO 83

Kholoptsev O.V., Zudilova L.A.FEATURES OF TEMPORAL VARIABILITY
OF THE RELATIONS BETWEEN CONCENTRATIONS RB AND K IN FRACTIONS OF AEROSOL
ON THE COAST OF THE BLACK SEA (BY AN EXAMPLE OF THE C. SEVASTOPOL) 86

Shevchuk Y.F.

MODERN STATE AND PROBLEMS OF DRINKABLE WATER-SUPPLY OF POPULATION OF UKRAINE 90

Schegulna Y., Savitskiy V.CHARACTERISTICS OF CHEMICAL COMPOSITION
AND WATER QUALITY OF SOUTHERN BUG RIVER BASIN 93**ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY****Burka V.**

PROBLEMS RECONSTRUCTION AND DISASSEMBLY OF BUILDING INDUSTRY PRODUCTS 98

Gerenchyk M., Zayachyk M.

GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE LABOR FORCE OF KHMELNITSKY REGION 103

Zablotska A.

THE MAIN FORMS OF HISTORICAL AND CULTURAL TOURISM RESOURCES 107

Zayachuk O., Dronyak G.THE NET OF GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS
IN THE IVANO-FRANKIVSK REGION: PRESENT-DAY STATE OF DEVELOPMENT 111**Ilyiv O.M.**

TERRITORIAL ORGANIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS IN VOLYN REGION 116

Kuzyshyn A.

ANALYSIS OF ELECTORAL ACTIVISM IN THE LIGHT OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX 120

Lopushnyak L.V.THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
OF THE ANALYSIS TYPES AND CLASSIFICATIONS OF UNEMPLOYMENT 125**Symochko A.V.**DESTINATIONS EFFECTIVE INVOLVEMENT FORTIFICATIONS TRANS-CARPATIAN REGION
AS TOURIST OBJECTS 129**Javorska V.**

THE BASIC CATEGORIES AND CONCEPTS OF GEODEMOGRAPHIC PROCESS 134

ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ ДОЛИНИ ДНІСТРА НА ВІДРІЗКУ М. ХОТИН - ДО С.ОЖЕВО

Ходан Г., Камінська Л.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Регіон розташований у західній частині Середнього Придністер'я. Він займає правий берег долини Дністра від м. Хотин до с. Ожево. З півночі його оконтурює русло Дністра, а з півдня вододільна поверхня.

Ключові слова: морфологічні одиниці, ландшафтні комплекси, антропогенні зміни

Вступ: Вивчення ландшафтних комплексів є необхідною передумовою розробки географічних основ раціонального природокористування.

Ландшафтні комплекси варто охороняти від негативного впливу антропогенного і природно-антропогенного процесів з метою забезпечення максимальної збереженості ландшафтів і раціонального використання їхнього ресурсного потенціалу. Для розв'язання цієї проблеми необхідно розробити наукові основи раціонального природокористування, що включають і комплексні заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Мета: Метою роботи є вивчення антропогенної зміни ландшафтних комплексів долини Дністра, джерела та причини їх забруднення, стану природокористування.

Виклад основного матеріалу. Регіон розташований у західній частині Середнього Придністер'я. Він займає правий берег долини Дністра від м. Хотин до с. Ожево. З півночі його оконтурює русло Дністра, а з півдня - вододільна поверхня. Згідно із класифікацією Л. І. Воропай досліджувана територія входить до Кельменецького і Сокирянського природних районів області Прут-Дністровського межиріччя.

На досліджуваній ділянці долини Дністра переважають терасові місцевості, що мають широке розповсюдження. Добре виділяються місцевості високих терас, середніх і низьких терас. Найкраще виражені високі тераси.

Високі надканьйонні тераси, на сарматських глинах і вапняках з темно-сірими і сірими лісовими ґрунтами на лесоподібних суглинках, розорані, місцями під рослинністю.

Ця місцевість включає складні урочища VII - IX терас Дністра. Їх відносна висота коливається від 140-145 м (VII) до 220-225 м (IX). Це в основному слабо нахилені до () до русла Дністра поверхні, прорізані долинами бокових приток. Уступи терас не завжди простежуються, оскільки вони досить часто розмиті й занесені делювієм. Прослідковуються і сильно розчленовані ділянки терас, прорізані балками і ярами. Складені тераси

потужною товщею лесів, суглинків. Суглинки підстилаються алювієм різної потужності (від 3 до 15 м).

Цоколем терасових відкладів є неогенові і крейдові породи (глини, мергелі, вапняки), що мають моноклінальне залягання. Ці породи переважно знаходяться під алювієм на глибині 60-90 м.

Найбільш добре вираженою є VIII тераса. Вона зустрічається на всій протяжності долини Дністра, ширина окремих ділянок сягає 2-2,5 км.

У зв'язку з висотним розташуванням, глибоким врізом долини Дністра і його допливів ґрунтові води високо терасованих місцевостей залягають порівнянно глибоко (5-20), що добре дреноються. Ґрунтові води переважно гідрокарбонатно-кальцієві.

На високих терасах розвинений тип сірих лісових опідзолених ґрунтів, місцями слабо змитих. Місцями можна зустріти незначні ділянки опідзолених чорноземів.

Високі тераси розорані. Тому природна рослинність збереглася лише у вигляді невеликих ділянок (діврови) і ділянок злаково-бобових різнотравних лук.

Верхньотерасові місцевості сформовані урочищами, які широко використовуються в сільському господарстві

Середні надканьйонні тераси, на вапняках, з темно-сірими лісовими ґрунтами і опідзоленими чорноземами на малопотужних лесоподібних суглинках.

Середньотерасові ландшафтні комплекси характеризуються невеликим розповсюдженням по площі. Це в основному схилі поверхні з кутом нахилу до русла Дністра від 3° до 5°.

Місцевість складена із складних урочищ V і VI над заплавних терас, часто нерозчленованих. Вони мають малу потужність лесоподібних суглинків, що перекривають потужну (5-7 м) товщу карпатських галечників.

Відносна висота терас коливається від 90-100 м до 120-130 м. Цоколь знаходиться на висоті 70-100 м сарматського і торгонського віку.

Для даного виду місцевостей характерні чорноземи змиті, місцями з виходами корінних

порід. Внаслідок своєї крутизни середньотерасові ландшафтні комплекси в сільському господарстві використовуються менше, ніж високотерасові. Переважно їх використовують як пасовища і частково розорані.

Низькі середньоплейстоценові розорані тераси, на щільних породах кембрію з темно-сірими лісовими опідзоленими ґрунтами і чорноземами глибоко вилугуваними на лесоподібних суглинках.

Місцевість представлена урочищами терас, що належать до внутріканьйонних. Найкраще ці тераси виражені в районах сіл Грушівці, Макарівна, Вороновиця.

Відносні висоти їх поверхні від 45-50 до 60-70. Тераси ерозійно акумулятивні. Вони врізані в породи кембрію різного літологічного складу. Висота цоколя 15-35 м, товща алювію 10-15 м.

У зв'язку з тим, що тут водоносний горизонт залягає неглибоко, ґрунтове зволоження значне. Характерними ґрунтами є темно-сірі лісові і чорноземи типові вилуговані.

Низькі пізньоплейстоценові внутріканьйонні розорані і селитебні тераси, з чорноземами карбонатними і звичайними на алювії, підстилаючі щільними породами кембрію.

Місцевість складається із складних урочищ I і II надзаплавних терас із відносною висотою 12-15 м і 25-35 м. Цоколь залягає на глибині 10-20 м. Вік цоколя на заході - силурійський, на сході - кембрійський.

Ці тераси об'єднує:

- а) рівнинний рельєф;
- б) добра зволоженість;

в) притік води і корисних речовин з більш високих схилів.

Ксеротермальність клімату, відносна молодість терасових ґрунтів пояснює ослабленість промивних процесів. У результаті утворилися карбонатні і звичайні чорноземи.

Для нижньотерасових місцевостей характерний інтенсивний розвиток яружно-балкових форм, що пов'язано з тектонічними підняттям території. На крутих схилах ярів розвинуті дернові ґрунти, які на днищах ярів змінюються кам'яними розсипами. Кам'яні розсипи характерні і для поверхней I тераси.

Рівень ґрунтових вод на I і II терасах досить високий (2-5 м). Цим частково і пояснюється переважання поселень на нижніх терасах.

Природна рослинність розвинута слабо (на еродованих уступах) і представлена в основному злаково-бобово-різнотравними, а на більш зволжених ділянках осоково-різнотравними асоціаціями.

Заплава під лучною рослинністю, з дерновими ґрунтами на заплавному алювії.

Розповсюдження цієї місцевості в долині Дністра досить обмежене (заплава затоплена в результаті зведення Дністровської ГЕС). Найкраще вона виражена в районі сіл Кормань, Молодово, Дністрівка. Тут вона досягає 300-350 м.

Відносна висота заплави - 5,0-7,5 м. Вік її післяльодовиковий, голоценовий.

Заплавна місцевість складається зі складних урочищ верхньої і нижньої заплави. Їх поверхня складена молодими в долинному комплексі алювіальними (суглинками) відкладами. Характеризується молодим рівнинним рельєфом з окремими мікроформами.

Мікроклімат порівняно з терасовими місцевостями, більш вологий. Заморозки тут згубні.

Ґрунтові води знаходяться на глибині від 1 до 5 м. Завдяки цьому й періодичному затопленню в заплаві утворюється постійне зволоження. В геохімічному відношенні це супераквальні ландшафти. Ґрунти в основному дернові на суглинистому алювії і алювії вапняків.

Для заплави Дністра характерні кам'янисті розсипи. В трав'яному покриві заплавної місцевості переважають злаково-різнотравні й осокові утворення.

У цілому для заплави місцевостей характерні складні урочища високої та низької заплави, однак межі між ними майже непомітні.

Ландшафтні комплекси балок і малих долин (долинно-балкові).

Ландшафтні комплекси балок і малих долин пов'язані зі схиловими місцевостями. Вони спостерігаються вздовж усієї долини Дністра. Долинно-балкові ландшафтні комплекси прорізають усі висотно-зональні долинні комплекси. Тектонічне підняття Середнього Придністер'я зумовило глибокий вріз малих долин і балок. Це призвело до руйнування корінних порід, а в результаті - до широкого розповсюдження кам'яних розсипів на днищах. Бокові притоки внаслідок своєї протяжності прорізають породи різного літологічного складу.

Рослинність долинно-балкових ландшафтних комплексів лісова (діброви) і лучна з великою кількістю степових представників, на днищах більш гідрофільна.

Ґрунти днищ в основному лучні, лучно-болотні і чорноземно-лучні на алювіально-делювіальних відкладах.

Круті цокольні уступи терас із скельними виходами корінних порід, слабозадерновані, з еродованими ґрунтами на елювіально-делювіальних щебенистих відкладах.

Місцевості цокольних уступів терас характерні для випрямлених ділянок долини Дністра. Це круті скам'янілі схили, що утворюють справа від русла

Дністра своєрідну стінку. Тому ландшафтні комплекси цокольних уступів терас називають стінками. Складені стінки породами різного віку: силурійськими вапняками з прошарками мергелів, алевроїтів, аргілітів; пісковиками, мергелями, опоками сеномана.

Тимчасові водотоки утворили на поверхні стінок борозди - ритвини. Ґрунти даних місцевостей еродовані на елювіально-делювіальних відкладах. На них сформувались низькорослі кущові ліси з дуба скельного, вишні, граба, ліщини тощо.

Природні комплекси стінок мають проти-ерозійне й водоохоронне значення.

Висновки. Ландшафт долини Дністра сформувався на основі закономірного співвідношення морфологічних одиниць, що утворились на спільній структурно-літогенній основі.

Кожен ландшафтний комплекс індивідуальний, а територіально має певну кількість аналогів. Усі аналогічні ландшафтні комплекси одного рангу утворюють певну типологічну категорію (вид, тип, клас).

Найбільш широкий спектр ландшафтних комплексів мають меандрові ділянки долини Дністра, де найбільш повно виражений комплекс терас.

Список літератури

1. Воропай Л.И. Эрозионные процессы на Среднем Приднестровье. Воропай Л.И., Куница Н.А. - Вестник МГУ. Серия географическая. 1965. № 5.
2. Воропай Л.И. Антропогенная преобразованность природно-территориальных комплексов Среднего Приднестровья. Воропай Л.И., Дутчак Н.В., Куница Н.А. // Вопросы их рационального использования и охраны природных ресурсов Украинских Карпат и Прикарпатья - К.: УМКВО при Минвузе УССР, 1989. - С. 67-74.
3. Гуцуляк В.Н. природные условия средней части Прут-Днестровского междуречья. - Черновцы, 1978.
4. Дутчак М.В. Ландшафтні комплекси Середнього Придністеря та їх зміни під впливом гідротехнічної системи /М.В.Дутчак.- Чернівці: Видавничий дім "РОДОВІД", 2013. - 160 с.
5. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. - Л.: Издво- во ЛГУ, 1976. Ч. I.
6. Природа Чернівецької області /за ред. К.І.Геренчука. - Львів: Вища школа, 1978. - 160 с.
7. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. М.: Наука, 1978.
7. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география -К.: Высшая школа, 1988. - 191 с.

Ходан Г.Д., Каминская Л. Ландшафтные комплексы долины Днестра на отрезке г.Хотин-с.Ожево. Регион расположен в западной части Среднего Преднистрья. Он занимает правый берег долины Днестра от г. Хотин до с. Ожево. С севера его оконтуривает русло Днестра, а с юга водораздельная поверхность.

Ключевые слова: морфологические единицы, ландшафтные комплексы, антропогенные изменения

Hodan G.D., Kaminska L. Landscapes Dniester valley in the interval c.Hotin - to c.Ozhevo. The region is situated in the west of middle Dniester region. It occupies the right bank of the Dniester valley of Hotin from Ozhevo. From the north it okonturyuye Dniester and to the south the watershed area.

Key words: morphological units, landscape systems, human-induced changes